

## NOTAS

Nombre del Médico: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Nº Contacto: \_\_\_\_\_

Nombre del Enfermero: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Nº Contacto: \_\_\_\_\_

Notas: \_\_\_\_\_

Coloque aquí la tarjeta de presentación del consultorio médico

Visite nuestro sitio web:

[Poziotinib - Lung - Cancer - Study.com](http://Poziotinib-Lung-Cancer-Study.com)



© 2018 Spectrum Pharmaceuticals, Inc.  
Todos los derechos reservados. SPECTRUM  
PHARMACEUTICALS, INC.® es una marca registrada de  
Spectrum Pharmaceuticals, Inc. y sus subsidiarias.  
POZ180303100

# POZIOTINIB

INFORMACIÓN PARA PACIENTES

*Cómo Manejar los Efectos Secundarios*



Poziotinib es un fármaco de investigación que no ha sido aprobado por la FDA.



## Introducción

Poziotinib pertenece a una clase de fármacos conocida como Inhibidores de la Tirosina Quinasa (ITQ). Debido a que esta clase de fármacos tiene un mecanismo de acción diferente al de los fármacos de quimioterapia convencionales, tienen efectos secundarios únicos.

Los efectos secundarios experimentados más comunes con los ITQ incluyen erupciones, diarrea y mucositis.

Estos efectos secundarios pueden ser manejados con la ayuda del equipo de su estudio. Además, se ha mostrado que la aparición de estos efectos secundarios con fármacos ITQ, tales como una erupción, sirven como señales de que esos productos pueden tener efecto en los objetivos.

La finalidad de este folleto es proporcionar a los pacientes y prestadores de atención, información sobre los efectos secundarios entre los pacientes que reciben poziotinib.

## Efectos Secundarios:

### Erupciones de la piel

Los pacientes en el ensayo con poziotinib pueden experimentar erupciones en la piel del rostro y/o cuerpo. Típicamente, esta erupción puede verse como una erupción de acné.



### ¿Cuándo debo llamar a mi doctor?

Ante la primera aparición de la erupción, llame al equipo del estudio con poziotinib y siga sus consejos.

### Siga estos pasos:

- » Aplique un humectante hipoalergénico, sin alcohol y sin aroma a diario y en los pies y manos al ir a dormir
- » Tome muchos líquidos (al menos dos litros por día) para mantenerse hidratado, y evite la cafeína
- » Aplique un protector solar sin aceites de al menos FPS 30 y use ropa protectora bajo la luz solar
- » Evite las duchas calientes
- » Evite caminar descalzo y usar calzado apretado
- » Sólo use maquillaje hipoalergénico
- » Use detergentes y limpiadores faciales suaves
- » No use medicamentos anti acné de venta libre

## Diarrea

La diarrea es la deposición de heces blandas o acuosas 3 o más veces por día con o sin molestias.

### Información importante sobre medicamentos de prevención de diarrea:

Debido al riesgo de diarrea, se le dará un medicamento llamado loperamida para ayudar a prevenir la diarrea.

No debe dejar de tomar la loperamida sin consultar al médico de su estudio.



### ¿Cuándo debo llamar a mi médico?

Llame al equipo del estudio con poziotinib al experimentar diarrea y siga sus consejos.


### Siga estos pasos:

- » Pruebe una dieta de líquidos claros (una que incluya agua, caldo claro, paletas de helado y gelatina sin sólidos agregados) apenas comience la diarrea o cuando siente que está por comenzar.
- » Coma en cantidades reducidas y con frecuencia. No coma comidas muy calientes o picantes.
- » Evite las comidas grasosas, el salvado, las frutas y vegetales crudos y la cafeína.
- » No beba alcohol o consuma tabaco.
- » Evite la leche o productos lácteos si parecen empeorar la diarrea.
- » Asegúrese de que su dieta incluya comidas ricas en electrolitos (como las bananas, papas, albaricoques, naranjas y bebidas deportivas como Gatorade® o Powerade®)



## Mucositis (Mouth Sores)

Las llagas orales son pequeños cortes o úlceras en la boca. La lesión puede ser muy roja, o puede tener pequeñas manchas blancas en el medio. Estas llagas orales pueden sangrar o infectarse. Estas llagas orales pueden tener distintas causas, y un fármaco ITQ puede ser una de ellas.



### ¿Cuándo debo llamar a mi médico?

Llame al equipo del estudio con poziotinib ante la primera aparición de esas llagas.

## Siga estos pasos:

- » Revise su boca dos veces por día usando una pequeña linterna y un palito de helado con un recubrimiento suave. Si usa dentadura, quítesela antes de revisar su boca.
- » Siga el plan de cuidados orales a continuación, 30 minutos después de comer y cada 4 horas mientras esté despierto, o al menos dos veces por día a menos que le hayan indicado otras instrucciones:
- » Cepille sus dientes usando un cepillo de cerdas de nylon suaves. Para suavizar aún más las cerdas, empape el cepillo en agua caliente anteriormente y enjuáguelo con agua caliente durante el cepillado. Si el cepillo duele, use un palito de helado envuelto con gasas.
- » Consiga hisopos bucales de esponja suave para limpiar sus dientes (puede comprarlos en una farmacia).
- » Use una crema dental que contenga flúor.
- » Elija comidas suaves, húmedas y fáciles de tragar. Cuando su boca le duela, pruebe cereales cocinados, puré de papas y huevos revueltos.
- » Evite beber jugos de naranja, limón, tomate o pomelo y bebidas alcohólicas. Evite las comidas picantes o las comidas o bebidas que contengan azúcar tales como los dulces y refrescos soda.

## Otros efectos secundarios

Usted puede experimentar otros efectos secundarios menos comunes y que no estén enumerados aquí.



**Si nota cualquier síntoma inusual, por favor llame al equipo del estudio con poziotinib.**

### Siga estos pasos:

- » Lleve un diario de sus tabletas de poziotinib
- » Comparta la información sobre todos los medicamentos/suplementos/hierbas que esté tomando
- » Haga ejercicio regularmente, ya que esto ha mostrado que disminuye la fatiga relacionada al cáncer
- » Conserve un peso saludable
- » Duerma al menos 7-8 horas por las noches y si es necesario duerma una siesta al principio de la tarde